FAMILIAS

MOMOTIDAE Y BUCCONIDAE

MOMOTIDAE

Los momotos o *Momotidae* son una familia de aves tropicales del orden de los Coraciformes, que incluye también a los martín pescadores, los abejarucos y los carracos.

Son pájaros de tamaño mediano de las selvas densas. Se encuentran sólo en la zona tropical del Nuevo Mundo (aunque se ha descubierto un fósil en Suiza). Estas aves tienen el plumaje blando y las colas largas, que mueven de lado a lado. En todas las especies menos las dos primeras en la lista de abajo, las plumas centrales de la cola (que son las más largas) tienen una parte del astil desnudo, así que se parecen a una raqueta.

Aves de picos fuertes y aserrados. Su nombre se debe a que anidan en túneles excavados por ellos mismos en los barrancos, utilizando para esto una forma especializada de su pata que es característica de esta familia. Son mas activas al amanecer y al finalizar el día. Tienen unidos 2 de los dedos anteriores, características que recibe el nombre de sindactilia. Las alas son cortas y redondeadas que le permiten realizar un vuelo ondulante.

CLASIFICACIÓN



Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Coraciiformes

Familia: Momotidae

Géneros

Aspatha
Baryphthengus
Electron
Eumomota
Hylomanes
Momotus

COMPORTAMIENTO

Son aves solitarias o forman parejas. Es territorial y tranquilo, permanece quieto por largos periodos de tiempo y vocaliza a menudo con reclamos graves y profundos. Se mueve de un lado a otro, en incesante compás.

Anidan a principios de la temporada de lluvias, para aprovechar el aumento de insectos y poder alimentar a las crías.

Los jóvenes comienzan a dejar el nido a los 26 días de nacidos, en promedio, y esto ocurre durante la segunda y tercera semana de julio. Sin embargo, cuando vuelan por sí solos aún reciben comida de sus padres, dependencia que continúa hasta las cuatro o seis semanas después de abandonar el nido.

REPRODUCCIÓN

Las hembras ponen sus huevos a finales de mayo y a inicios de julio, siendo la actividad más alta en mayo y junio.

Lo más común es que pongan cuatro huevos, aunque se han encontrado nidos de cinco, dos y tres huevos.

La incubación comienza con el primer huevo, de manera que los polluelos nacen en diferentes días. Macho y hembra comparten la tarea de incubación durante períodos largos de hasta tres horas, la hembra, por lo general, lo hace durante la noche.

.

El período de incubación dura entre 15 y 19 días, intervalo entre la puesta del último huevo y el nacimiento del último polluelo.

Los padres crían a los polluelos constantemente los primeros tres o cuatro días y luego sólo los alimentan en la mañana, dejándolos sin atención en las noches.

Al nacer, los polluelos están completamente desnudos, de color rosado y con poca coordinación en sus movimientos. A los cuatro días han triplicado su peso y tienen mayor coordinación y al sexto día aparecen las primeras plumas negras en el cuerpo y otras más claras en la cabeza. Abren los ojos a los siete días y a los nueve ya muestran algunas plumas color turquesa.

Cuando cumplen trece días de nacidos, los polluelos tienen el 77% de su peso adulto. Las plumas negras de la cabeza aparecen más marcadas entre los 15 y 20 días, al tiempo que las del cuerpo y las alas crecen rápidamente. La última semana del desarrollo de las crías en el nido se caracteriza por una brillantez en su plumaje.

ALIMENTACIÓN

Los momotos se alimentan de presas pequeñas como insectos y lagartijas, y también de frutas. Como la mayoría de los Coraciiformes, anidan en túneles en las lomas, poniendo aproximadamente
vos.

CURIOSIDADES

- Cuando anidan suele ocurrir que el macho lleve a la hembra una ramita, semillas, frutas pequeñas o insectos. Las ofrece a su pareja, quien puede o no aceptar el regalo. Si lo rechaza, entonces el macho lo arroja y se aleja.
- Es un pájaro sedentario y muestra una fuerte fidelidad al sitio que habita.

- Son más agresivos durante el establecimiento de su territorio, la formación de parejas y la excavación de sus nidos, épocas en las que se retan amenazadoramente.
- Anida en colonias que van desde dos parejas hasta treinta, con los nidos separados por una distancia de 50 cm. a 2 m., y defienden su pequeño territorio alrede a del nido.

BUCCONIDAE

Los **Bucconidae**, tropicales que son endémicos de América del Sur a México.

Ellos se relacionan con los Yacamará, pero les falta el colorido iridiscente de esa familia. Ellos son principalmente castaños, rufos, con las cabezas grandes y los picos chatos con una punta encorvada, patas cortas y débiles . El plumaje laxo y abundante suelto y las colas angostas les hacen parecer robusto e hinchado, dando lugar al nombre inglés de la familia

CLASIFICACIÓN

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Piciformes

Familia: Bucconidae

Géneros

Notharchus
Bucco
Nystalus
Hypnelus
Micromonacha
Nonnula
Hapaloptila
Chelidoptera
Malacoptila
Monasa

Solitario en rama alta o baja expuesto temprano o parcialmente oculta. Los bobos son relativamente inactivos y se posan silenciosos por largos periodos en sus perchas, desde donde vuelan para capturar invertebrados grandes o vertebrados pequeños .



ALIMENTACIÓN

Ellos de alimentan de insectos y vertebrados pequeños. Como la mayoría de sus parientes, este grupo nidifica en cavidades, poniendo 2 a 3 huevos blancos glaseados en un hueco en la tierra o en termitero. Son muy confiados, permanecen casi inmóviles, hábitos crepusculares, silbidos finos.